


L'ÉCHELLE DES VISAGES



Définition

C'est une échelle d'auto-évaluation, proposée en 1988 par Wong et Baker.

Bien qu'ayant été conçue pour être utilisée en milieu pédiatrique, elle est apparue valide et fiable chez l'adulte et le sujet âgé. Elle peut être employée en cas de difficulté d'utilisation de l'EVA, de l'EN ou de l'EVS, par exemple chez le patient ayant des difficultés de verbalisation (aphasie, dysphonie, intubation,...)

Description

Elle comporte 6 visages exprimant une douleur d'intensité croissante :

- Intensité **0** : aucune douleur
- Intensité **2** : douleur faible
- Intensité **4** : douleur moyenne
- Intensité **6** : douleur sévère
- Intensité **8** : douleur très sévère
- Intensité **10** : douleur intolérable

Modalités d'utilisation

- Vérifier au préalable l'acuité visuelle du patient
- Déplacer le doigt sur les différents visages et lui expliquer que "chaque visage correspond à une intensité douloureuse différente"
- Pointer le visage à l'extrême gauche et lui indiquer qu'il "*correspond à une absence totale de douleur*"

- Pointer le visage à l'extrême droite et lui indiquer qu'il *"correspond à une douleur intolérable "*
- Lui laisser montrer le visage qui décrit le mieux ce qu'il ressent
- Repérer le visage et le convertir dans la cotation

Limites de l'échelle des visages

Certains, parmi les visages, notamment ceux en larmes, trouvent moins d'écho dans la population adulte et âgée que chez les enfants