

Contexte de contamination des soignants par le SARS-CoV-2 : Résultats préliminaires au 09/06/2020

Le Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux (Geres), a initié une étude, soutenue par SpFrance et la Haute autorité de Santé, visant à décrire les circonstances de contamination des professionnels de santé par le SARS-CoV-2.

Cette enquête s'adresse aux professionnels de santé des 3 secteurs de soins (établissements de santé (ES), ville ou établissements médico-social) quelle que soit leur profession. Tout professionnel de santé, pour lequel un diagnostic de COVID-19 a été posé suite à un test positif (PCR, sérologie), ou suspecté sur des signes cliniques, peut participer. L'enquête a démarré le 17 avril 2020 et est toujours en cours.

Entre le 17 avril et le 09 juin 2020, **2 129 questionnaires ont été complétés**. Les infirmiers, médecins et aides-soignants représentaient respectivement 32%, 22% et 14% des répondants ; 68% exerçaient en établissement de santé, 18% en secteur de ville et les autres répondants exerçaient dans le secteur médico-social.

Plus d'un répondant sur 2 (55%) exerçait en région Ile de France, Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté. La région Ile de France comptabilisait à elle seule 28% des répondants. Le pic de début des symptômes se situe durant la semaine du 16 au 23 mars. Aucun début de symptôme n'est décrit après le 1er juin.

Dans les deux semaines précédant leurs symptômes, 287/2 129 (13,5%) des déclarants avaient exercé dans le cadre d'un intérim ou d'un renfort en établissement de santé. **Lors des entretiens avec les patients (en face à face, à moins d'un mètre), 416/1 446 (29%) des soignants en ES, et 217/403 (53%), en ville ne portaient jamais de masque.**

En ville, 169/403 (42%) des soignants contaminés réalisaient des visites à domicile. Parmi les 870/1 146 (76%) soignants qui ont déclaré avoir participé à des réunions de travail, 558/870 (64%) ne portaient jamais de masque ou n'en portaient que parfois à cette occasion.

En salle de repos, lors des pauses, 1 235/1 446 (85%) soignants ne portaient pas de masque ou le portaient occasionnellement.

Six cent trois (28%) répondants ont déclaré avoir été en contact, sans masque, avec un collègue ayant une infection confirmée à SARS-CoV-2, pendant ses symptômes ou durant les précédentes 72h.

En dehors de leur activité professionnelle, 278/2 129 (13%) professionnels contaminés ont été en contact avec au moins un cas suspecté ou confirmé d'infection à COVID-19

Ces premiers résultats seront complétés ultérieurement mais soulignent d'ores et déjà un **défaut d'utilisation des mesures de protection lors des tâches de soins exercées par certains professionnels, notamment en ville**, sans qu'il soit possible à ce stade d'en identifier les raisons.

Par ailleurs, le rôle d'une contamination entre soignants sur leur lieu d'exercice, en salle de réunion ou en salle de pause, semble déterminant.